

Cuando Utilice “pilas” u otros depositos para recrearse, añade cloro media hora antes de su uso.

Use dispositivos protectores para la nariz.



Tabla de Cloración

Volumen de Agua a Desinfectar (lts)	* Hipoclorito de Sodio al 6 %	
	Milímetros ³	Cucharadas
1.000	30	4.0
2.000	60	8.0
3.000	90	12.0
4.000	120	16.0
5.000	150	18.0
6.000	180	20.0
7.000	210	24.0
8.000	240	28.0
9.000	270	32.0
10.000	300	36.0

Nota: 1 metro cúbico = 1.000 litros

Usar cuchara sopera

* Cloro Comercial Doméstico

Para cualquier información acuda a su más cercana Unidad de Control Sanitario en el Estado

UCS Agua Prieta, Calle 5 No. 1050 entre Av. 10 y 11, Tel: (633)338-73-98; **UCS Caborca**, Calle 4 No. 181 int 3 Centro, Tel: (637)372-80-80; **UCS Cananea**, Calle Sexta Este No. 9 Tel: (645)332-46-55; **UCS Guaymas**, Av. 6 s/n / Calles 15 y 16 Tel: (622)224-00-66; **UCS Hermosillo**, Gastón Madrid No. 10 entre Matamoros y Juárez, Col. Centro. Tel: (662)213-70-77; **UCS Huatabampo**, Av. Tecnológico s/n Col. la Cuchilla Tel: (647)426-34-85; **UCS Magdalena**, Av. 5 de Mayo y Morelos No. 100-A Col. Centro, Tel: (632)322-42-67; **UCS Moctezuma**, Calle Pesqueira s/n Col. Reforma Tel: (634) 243-06-15; **UCS Navojoa**, Jiménez No. 202, entre Pesqueira y Otero, Tel: (642)422-75-30; **UCS Nogales**, Obregón No. 1552, Col Bolivar Tel: (631)313-36-16; **UCS Obregón**, Michoacan s/n /Rodolfo E.C. y 6 de Abrol, Tel: (644)415-61-38; **UCS Puerto Peñasco**, Blvd. Fremont y Prol. Chihuahua No. 142-A, Tel: (638)383-19-52; **UCS San Luis Rio Colorado**, Av. 5 de mayo No. 615, Local 2, entre calles 6 y 7, Tel: (653)536-42-30; **UCS Santa Ana**, Obregón No. 200, Local 9, Plaza Cassandra, Tel: (641)324-20-38;

Unidos logramos más

COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA

Paseo del Canal y Comonfort, Planta Baja,

Ala Norte. Centro de Gobierno

Hermosillo, Sonora

Tel. (01 662) 22 60 93, 22 21 63

Sin Costo 01 800 4 RIESGO (74 37 46)

01 800 4 RIESGO (74 37 40)

www.saludsonora.gob.mx/rsanitaria




Secretaría de Salud Pública

COESPRISSON
Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora

Lo que usted debe saber acerca de la

AMIBA de VIDA LIBRE (AVL)



Unidos logramos más

Qué es la AVL

Protozoarios presentes en el suelo, agua y aire. Los géneros más comunes que afectan al humano son:

Naegleria spp: entra al organismo via mucosa nasal y nervio olfativo. Invade al cerebro causando meningoencefalitis fulminante

Acanthamoeba spp: invade por lesiones de la piel, llegando al cerebro y meninges; causa afecciones prolongadas. Son más susceptibles a personas con alguna inmunodeficiencia



¿Modo de transmisión?



Zambullirse,
saltar, nadar o
bucear en
lagos, arroyos,
canales o
albercas con
manteni-
miento
deficiente

¿Tiempo de desarrollo de la enfermedad?

3 a 7 días para Naegleria, más tiempo para Acanthamoeba

La infección no se transmite de persona a persona

Sintomas:

- * Dolor de cabeza
- * Fiebre
- * Decaimiento
- * Vómito de proyectil
- * Alteraciones Mentales
- * Ataques Compulsivos
- * Coma y muerte en personas no atendidas oportunamente



Acuda de INMEDIATO al médico cuando aparezcan estas señales después de haber estado en contacto con agua NO TRATADA

¿Cómo prevenir la infección?

No se bañe en canales, arroyos, lagos. La amiba puede estar presente.

Utilice sólo albercas con tratamientos para el agua:

- Cloración
- Filtros

Recuerde que de 1 a 3 partes por millon de cloro residual es suficiente para eliminar a la amiba de vida libre

